

瘍科秘錄

九

藏圖書	二
部門	六
卷	一
冊數	二



瘍科秘錄目錄

卷九

竹木刺

百蟲入耳

誤吞鍼鐵碁子及錢硬骨硬等

諸獸咬傷

諸蟲咬傷

食鬼中毒

赤川賴介氏寄贈

四十五年八月五日  
第一号收



催シテ甲疽ノ如クナルモノ也ツマハラミ女紅ニテ誤テ針ヲ刺  
スモノハ多クハ肉中ニテ折ル其時直ニ去サル寸ハ  
針能肉中ヲ行モノ也假令ハ足心ニ刺モノハ上ツテ  
膝或ハ股ヨリ出ルチシヒラアリ掌ニ刺スモノハ上ツテ臂  
或ハ肩ヨリ出ルチシヒラアリ毫針ノ肉中ニテ折ルモ同シ  
恐ルヘキ也○治法先測瘡子ヲ瘡口ヘ入テ進退正  
斜シテ瘡中ヲ索搜シ竹木刺ノ分明ニ應スルモノハ  
披針ニテ瘡口ヲ切り廣ケ鑿子ニテ抜き去ルヘシ若  
シ刺鋒ノ皮上ニ突起スルモノハ其所ヲ切テ抜き去  
ルヘシ折タル刺ノ肉中ニ在テ抜き難キモノニハ赤

汞丹ヲ破敵メイチヤニ塗リ瘡中ニ挿入スレハ刺必  
ス膿ニ從テ出ルモノ也針ヲ刺タルハ逆トキモ刺タル口  
ヨリ抜き難キモノナリ其時直ナラハ針處ヲ切テ抜  
キ去ルヘシ竹木刺ヲ足心ニ踏貫タルモノ若シ雨雪  
ニ歩行シテ寒濕ヲ犯ス寸ハ破傷風ヲ發スルチアリ  
謹ヘシ水戸向井町富右衛門ノ男年十五歳ノ頃ニ贅  
牙チヲ生シ一牙科ニ就テ治ヲ請フニ牙科矢ト去器ヲ  
當テ槌ツツヲ把リカヲ極テ打ツニ贅牙脱然トシテ落ツ  
當人モ全ク脱タルコト、思ヒ喜フニ幾何モ無フシ  
テ兼泣ト鼻トノ間硬ク腫レ久シク消セス遂ニ膿ヲ

成シ自ラ潰ヒ膿出テ、後モ稀水滴瀝トシテ止マス  
 瘡口陷四邊愈硬ク腫レ因循トシテ久シク愈ス骨槽  
 風ノ如クニナリ醫全ク骨槽風ト為シ或ハ遺毒ト為  
 シテ療治ヲ施セ凡寸驗ナシ數年ヲ經テ後子カ門ニ  
 來テ治ヲ請フ乃チ測瘡子ヲ入テ瘡中ヲ搜索ニ露珠  
 應スル氣味全ク齒牙ノヤウニ覺ユ又贅牙ノ脱タル  
 創口へ測瘡子ヲ挿ニ入ル一ニ寸許リ目下ノ瘡中へ  
 通スルニ似タリ因テ齒牙ナル一ヲ決シ乃麻沸湯ヲ  
 與ヒ瘡口ヲ割開スルニ牙固ク顴骨中ニ在リ指頭ニ  
 テ撮ミ抜カントスレ凡膠固シテ去リ難シ又披針ニ

テ骨ト贅牙トノ間ヲ刺シテ分離セシメ大鑷子ヲ以  
 テ緊ク挾ミ捻ルニ乍聲ヲ成シテ脱タリ是ハ全ク牙  
 科ノ誤テ打込タルモノト見ユ實ニ奇事也竹木刺ニ  
 類セルユヘ此ニ録ス

竹木刺主治方

赤汞丹

破敵

麻沸湯

前衝

百蟲入耳

百蟲ノ耳ニ入ルハ夏月暑時ニ有ル一也暗夜ノ閑坐  
 或ハ林下ノ涼陰ニ就キ午睡ヲシテ蟲ノ入ル一アリ  
 凡ソ耳中ニ入ル蟲ハ蚊カ蚋ハ蠅ム蜘蛛カ蜂ハ蟻ア馬陸マ鼠婦ソ木  
 魚ホ蠹ムノ類也小蟲ニテモ跳リ騷キテ鬩牛ノ聲ヲ成シ  
 或ハ螫ツテ刺痛ヲ發ス○治法麻油一味ヲ點滴シテ耳  
 中ニ盈ル寸ハ刺痛頓ニ止ミ蟲モ油ニ從テ出ルモノ  
 也又水銃ニテ水ヲ射入スル寸ハ蟲水ニ從テ出ルモ  
 ノ也

百蟲入耳主治方



嘔ニスレハ大抵ハ自カラ脱ルモノ也此法ニテ脱サ  
 ル者ハ吐方ヲ用フルヲ第一ノ良策トナス吐逆スル  
 ノ勢ニテ吞物ヲ吐出シ或ハ下へ下ル<sub>ル</sub>アリ吐法ハ  
 雙礬水吐酒石ヲ撰用スヘシ銅錢釣鈎碁子容豆磁算  
 盤子ノ類モ此術ニテ出ル也又患者ヲ僂シメ脊ノ第  
 七八推ノ邊ヲ拳ニテニツ三ツ強ク撲テ頓ニ出ル<sub>ル</sub>  
 アリ咽喉焮腫スル者ハ涼膈散加石膏ヲ少シ宛服ス  
 ヘシ

誤吞諸物主治方

雙礬水 丹礬 礬石各五分 水一合

右三味。湿和頓服。必發吐。吐則骨硬等亦從而出。  
 涼膈散加石膏 吐酒石





咬合寸ハ其毒ヲ傳染シテ乍風犬トナリ又他狗へ傳  
 染シテ愈多クナルナリ馬モ其毒ヲ傳染スル寸ハ狂  
 躁シテ必ス死スル也人ノ咬傷タルハ傷所兎角乾燥  
 シテ愈易キモノナリ疵ノ愈ルニ從テ大熱ヲ發シ狂  
 躁妄語シ煩渴引飲或ハ叫フフ犬吠ノ如ク或ハ食餌  
 ヲスルニ膳ニテハ食セズ飽ノ殼ナトニ盛テ出セハ  
 喜テ食シ其モ箸ハ用ヒス口カラ直ニ喰テ狗ノ喰ス  
 ル状ヲ為シ甚奇異ノ事アリ又煩渴シテ水穀升ヲ飲  
 ントスレハ水ニ對スル寸ハ驚怖シテ飲レ能ハス故  
 ニ和蘭ニテハ怯水病ト名ク是ハ他病ニナキ病候ナ

リ煩躁シテ日夜眠ル丁能ス數十日ニ至リ遂ニ疲勞  
 シテ死スルナリ或ハ最初徒ニ食禁ヲ謹嚴シ少々ノ  
 敷藥ニテ幸ニ愈數年ノ後ニ偶食禁ヲ犯シテ再發ス  
 ル者モ亦前状ヲ見シテ死スル也予狗モ夜中杯ニ誤  
 テ踏寸ハ人ヲ咬ム丁アリ乳狗モ人近ヨル寸ハ子ヲ  
 捕レン丁ヲ恐レテ人ヲ咬ム丁アリ何レモ風犬ノ例  
 ニ非ス大害ハナサヌモノ也○治法ハ先禁忌ノ物赤  
 小豆蕎麥麻油川鱗海魚鳥獸及酒ノ類何ニテモ膏梁  
 ノ物ハ遺サス却テ放ニ食スルヲ第一ノ良法トス若  
 シ禁忌ヲ謹テ愈ルモノハ數年ノ後ニ誤テ禁忌ノ物

ヲ食スル寸ハ必ス再發ス初ニ禁忌ノ物ヲ食スレハ  
後ニ決シテ再發ノ患ナシ自身ノ小便ニテ傷所ヲ清  
ク洗ヒ跡ヘ一面ニ灸ヲ炷ル丁數十壯ニ至リ先鋒ヲ  
貼シ白玉湯ヲ與ヒ紫金錠ヲ兼用トス次日ハ洗フ  
ヲ用ヒス灸ヲ炷膏ヲ貼スル丁前法ノ如クス十餘日  
ヲ經傷處潰爛テ濃汁ヲ出スニ至テ灸ヲ減ス或ハ毒  
ノ輕キ者ハ止ルモ亦可也瘡口ノ愈ルマテハ白玉湯  
ノ一方ニテ宜シ毒ノ尤深キ者ハ疵ノ四圍ヲ刺シテ  
血ヲ出シ又蝦蟆鱗ヲ喰シムヘシ風犬傷ノ妙藥奇方  
諸方書及ヒ諸家ノ傳ル所多ト云氏敢テ求ルニ及ハ

ス已上ノ方法ニテ必ス十全ノ功ヲ奏スルナリ平犬  
乳狗ニ咬レタルハハ傷處ヘ猛汞油ヲ貼シテ潰爛シ  
白玉湯或ハ五物解毒湯加杏仁ヲ與ヘシ  
馬ニ咬レタルハ何ニテモ大瘡ナルモノ也然レ此毒  
ノ薄キモノト見ヘテ大害ヲ成サス出血發熱疼痛等  
ノ諸証ハ金瘡ト同シ馬ニ性ノ柔順ナルト險詖ナル  
トニツ有リ險詖ナル馬ハ郊原ナトノ人ノ無キ地ニ  
至レハ自ラ詐リ倒レ騎リタル人ヲ墮シテ咬ミ或ハ  
馬子ヲ逐倒シテ咬ム丁アリ傍ニ救フモノナキ寸ハ  
膝ヲ折掛テ遂ニ咬ミ殺ス丁アリ其時人詐テ死セル

如クニナリテ居レハ馬モ其儘ニシテ去リ幸ニ死地ヲ免ル、了アリ○治法モ亦金瘡ノ治法ヲ撰用スヘシ内服ハ五物解毒湯ニ宜シ

鼠ニ咬レタル疵ハ至テ淺微ナレハ醫藥ヲ用ヒサルモ自カラ愈ルナリ愈タレハトテ安心ハナラス其毒内攻スレハ變化シテ諸證ヲ發シ或ハ不起ニ至ルモノアリ實ニ恐ル可キ了也咬處自カラ愈テ後十餘日ニシテ發シ或ハ二三十日ニシテ發シ或ハ二三年ヲ過テ發スル了アリ頭面胸腹四肢ヲ論セスシテ發ス疣瘡トシテ微腫ヲ發シ斑々トシテ雲片ノ如ク紫赤

色ニ變シ或ハ溫度痘瘡等ノ發班ノ如キ紫班ヲ發スル了アリ或ハ咬タル寸瘡口乍紫暗色ニ變シ自カラ腐蝕シテ癰疽ノ形状ニナルモノアリ是ハ毒瘡口ヨリ泄レ出ル故却テ吉兆也或ハ往来寒熱スル了微疫ノ如ク或ハ隔日ニ往来寒熱シテ瘡ノ如ク或ハ咳嗽盜汗神思鬱々トシテ樂マス虚勞ノ如ク見ユルモノアリ或ハ一身盡ク腫テ全ク水腫ノ状ヲナスモノアリ粗率ニ診スレハ他病ニ混シ治法ヲ誤リ易シ得ト診法ヲ詳ニシ病因ヲ明ニシテ治法ヲ誤ル了ナカレ○治法ハ大毒ノ治法ト畧同様ニテ第一瘡口へ灸ヲ炷

或ハ猛汞油ヲ貼シテ腐爛セシメ膿血ノ多ク出ルヲ  
 佳トス内服ハ五物解毒湯加鼠尾草ニ宜シ毒ノ深キ  
 者ハ紫金錠ヲ兼用トスヘシ一旦癩ノ愈テ後ニ再發  
 スルモノモ瘡痕へ灸炳或ハ猛汞油ヲ施シテ再ヒ潰  
 爛セシムヘシ微腫シテ色ノ赤ク變リタル處ハ刺テ  
 血ヲ出スヘシ瘡口ノ自カラ腐蝕スルノハ早ク腐肉  
 ヲ斷シ去リテ破敵ヲ貼スヘシ

人ノ咬ミタルモ大ニ毒アリテ害ヲ作ス丁アリ咬ミ  
 タル處大ニ痛ミ焮熱赤腫シテ寒熱スル丁疫ノ如ク  
 卒ニ腐蝕シテ膿血ヲ流シ筋骨マテモ腐敗シテ癰疽

ノ如ク癰瘡ノ如クニナルモノアリ或ハ其毒流注シ  
 テ大ニ膿ヲ作ス丁アリ人咬ヲ獸咬ノ中へ入ルハ  
 甚不吟味ノヤウナレ凡人トシテ人ヲ咬ムハ禽獸ニ  
 異ナラス又齒牙ニ毒アリテ害ヲ作ス丁亦獸咬ニ同  
 キ故姑ク此ニ附スル也○治法最初ナラハ刺テ血ヲ  
 出シ跡へ中黄ヲ貼シ五物解毒湯ヲ與フヘシ流注ノ  
 形状ヲ成スモノハ流注ノ治法ニ從ヒ癰疽ノ形状ヲ  
 成スモノハ癰疽ノ治法ヲ用フヘシ

諸獸咬傷主治方

白玉湯 叢桂 理猢猻咬人

和利金錄 卷卅

杏仁 三錢 桃根白皮 二錢

右二味以水二合煮取一合日二劑別杏仁葱白俱杵

成泥敷瘡口灸數十壯令口不合甚妙

紫金錠 同上即玉璆百一選方大乙紫金丹一名萬病解毒丸一名玉樞丹

山茲姑 去皮洗 川五倍子 洗 千金子仁 白者研低

兩 大戟 紅芽者去蘆一兩半 麝香 三錢

右五味重羅令勻用糯米濃飲和之木臼杵千杵作一

錢一錠病甚者連服 湯火傷毒蛇惡犬一切毒蟲並治和冷水磨塗仍服之詳百一選方

蝦蟆膾 同上

蝦蟆切取兩股去皮洗淨作膾柚橘芳芽之類適其

宜或炙食者効少如冬月乾蝦蟆煎服以多為妙其効大劣

五物解毒湯 先鋒 破敵 猛汞油

諸蟲咬傷

蝮蛇咬傷ハ毒ノ至テ迅速ナルモノ也咬ムト直ニ腫  
 レテ其毒瞬息ノ間ニ蔓延ス手ノ毒ハ乍チ肩背ニ至  
 リ足ノ毒ハ乍チ腰腹ニ及フ遂ニ全身ノ洪腫スルニ  
 至ルモアリ或ハ瘡口色ヲ變シ紫泡黒泡ヲ發スルモ  
 アリ或ハ腐敗シテ臭水ヲ流シ脱疽ノ如クニナリ指  
 ノ落ルモ腕ノ墮ルモアリ蛇毒ハ素ヨリ犬毒鼠毒ヨ  
 リ淺フシテ決シテ死ス一ハナキモノ也然レ凡若シ  
 治法ヲ遲緩ニスル寸ハ不起ニ至ルモノアリ故ニ初  
 發ニ油斷ナク治法ヲ施スヘシ○治法先ツ腫ノ至ラ

サル處ヲ細帶ニテ緊紮シ瘡口ヲ五六鍼モ刺シテ頻ニ血ヲ絞リ出スヘシ其毒油ノ如ク血ニ交リテ出ルナリ血盡ル寸ハ毒ノミ出ツ瘡口ニハ限ラス幾處モ刺シテ血ヲ出スヘシ瀉血スルヲ第一ノ良法ト為ス咬マレテ直ニ此術ヲ施ス寸ハ腫少フシテ大害ヲ為サス血ヲ取りタル跡ヘ雄黄ノ末ヲ中黄ニ和シテ貼シ越婢加朮附湯ヲ用フヘシ腫ノ消シテ後ハ五物解毒湯ニ宜シ腫ノ消散セサルモノハ毎日刺シテ出血ヘシ其毒甚深クシテ腐敗スルモノニ至テハ癰疽及脫疽ノ治法ヲ参考シテ治療ヲ施スヘシ○蜂螫モ小

患ニ非ス大ニ刺サル、寸ハ死スルアリ戲ニ蜂房ヲ取ラントシテ近寄寸ハ群蜂怒リ起テ其人ノ毛髮ノ中或被服ノ間ニ入テ螫スナリ大ニ螫ル、寸ハ疼痛忍ヒ難ク大熱煩渴ヲ發シ一身悉ク腫レ目モ見ヘヌ程ニ腫レ塞ルモノ也○治法速効ノ有ルハ牙垢ナレ氏多ク螫レタルニハ届キ難シ中黄ニ雄黄ノ末ヲ和シテ貼ス可シ内服ハ越婢加朮附湯ニ宜シ

諸蟲咬傷主治方

越婢加朮附湯

中黄

雄黄





トシテ日ヲ延クモノ也久シテ微ニ往来寒熱ヲ催シ  
盗汗咳嗽等出テ心思鬱トシテ樂マス患所依然ト  
シテ色ヲ變セス但筋脉掣痛ヲ覺ヒ永ク愈サル者多  
シ幸ニ膿ニ化シテ膿出ルモノハ諸證從テ退キ早ク  
愈ルナリ膿ニ化スル者ハ勿論膿ニ化セサル者モ死  
スルトハ無キ者ナリ○治法早ク膿ニ化セシムルヲ  
第一ノ上策トス葛根加朮烏湯ノ烏頭ヲ倍シ大劑ニ  
シテ頻服スレハ乍チ焮熱腫痛シテ膿ニ化スルモノ  
也膿ニ成ハ刺シテ膿ヲ去リ赤朮丹ヲ破敵メイチヤ  
ニ塗リテ日ニ挿入スレハ速ニ愈ルナリ兔毒ノ治法

此一手段ニテ足レリトス古ノ見合セノナキ病故素  
人ハ勿論醫者モ兔肉ノ毒トハ心付ス或ハ疫ニ混シ  
或ハ癘ト誤リ或ハ癩癰ト為シテ覺悟セス余ハ此診  
法ヲ心得テ居ル故病人ニ對シテ以上ノ證候アレハ  
決診シテ曰ク是ハ兔毒也近頃兔肉ヲ食シタル覺ア  
ルヘシト云ヘハ果シテ病人然リト云テ診法ノ妙ヲ  
感歎ス若膿ニ化セス往来寒熱咳嗽盜汗等ノアル者  
ニハ柴胡桂枝湯柴胡姜桂湯ヲ撰用スヘシ

食兔中毒主治方

葛根加朮烏湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾姜湯

破敵

赤汞丹

遊英

瘍科秘錄卷之九終

